
Indlægsseddel: Information til brugeren

Pascoflair, overtrukne tabletter

Ekstrakt af passionsblomst, urt

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel i brug, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apoteketspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.. Se punkt. 4.
Kontakt lægen , hvis du får det værre eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pascoflair
3. Sådan skal du tage Pascoflair
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pascoflair er et traditionelt plantelægemiddel til lindring af milde symptomer på mental stress og søvnbesvær.

Indikationen er alene baseret på traditionel anvendelse, dvs erfaringer med anvendelse kendt gennem længere tid.

Kontakt lægen , hvis du får det værre eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pascoflair

Tag ikke Pascoflair

- hvis du er allergisk over for passionsblomst eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pascoflair (angivet i punkt 6).

Børn:

Erfaring med behandling af børn er utilstrækkelig. Pascoflair bør derfor ikke anvendes til børn under 12 år.

Brug af anden medicin sammen med Pascoflair

Anden medicin kan påvirke behandlingen med Pascoflair eller Pascoflair kan påvirke behandlingen med anden medicin. Du skal derfor altid tale med apotek eller læge, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også for medicin som ikke er på recept, naturlægemidler, stærke vitamin og mineraler samt kosttilskud.

Der er i øjeblikket ikke kendskab til problemer med brug af Pascoflair sammen med andre lægemidler, naturlægemidler, stærke vitamin(mineraler eller kosttilskud).

Package leaflet-DK:

Product name: Pascoflair
Last update: 18.04.2016

2

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Pascoflair.

Bør ikke anvendes af gravide og ammende på grund af mangel på tilstrækkelige data.

Der er ingen tilgængelige studier af påvirkning af frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pascoflair kan virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. Hvis du er påvirket, bør du ikke køre bil eller betjene farlige maskiner.

Pascoflair indeholder glucose, saccharose og maltodextrin

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter

3. Sådan skal du tage Pascoflair

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekpersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekpersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Voksne og ældre:

Til lindring af milde symptomer på mental stress:
2-3 tabletter dagligt, fordelt jævnt over hele dagen.

Ved søvnbesvær:

1-2 tabletter en halv time før sengetid.

Den maksimale dosis er 3 tabletter dagligt.

Pascoflair skal synkes hele med rigelig væske (helst et glas vand).

Hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage, eller hvis du får det værre, skal du kontakte din læge.

Brug til børn

Erfaring med behandling af børn er utilstrækkelig. Bør derfor ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Pascoflair-tabletter

Kontakt læge, skadestue eller apotek hvis du eller andre, eller hvis du tror et barn har taget flere Pascoflair end der står her og vekkommende af den grund føler sig utilpas. Tag pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af overdosering med Pascoflair.

Hvis du har glemt at tage Pascoflair

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du har flere spørgsmål om brugen af dette lægemiddel.

Hvis du holder op med at tage Pascoflair

Package leaflet-DK:

Product name: Pascoflair
Last update: 18.04.2016

3

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der er i øjeblikket ikke kendskab til bivirkninger inden for den godkendte anvendelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Må ikke opbevares over 30 °C. Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter "EXP." Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pascoflair indeholder:

- Aktiv substans: 425 mg ekstrakt (som tørreksrakt) af *Passiflora incarnata* L., herba, (DER 5-7:1), svarerende til ca. 2-3 g tørret passionsblomst, urt.
Ekstraktet er fremstillet med ethanol 50 % (V/V).
- Øvrige indholdsstoffer: Saccharose, maltodextrin, talkum, calciumkarbonat, croscarmellosenatrium, silica (kolloid, vandfri), cellulose), stearinsyre, hypromellose, akaciegummi, magnesiumstearat, titaniumdioxid E171, glukose (flydende, sprøjtetørret), tragant, shellac, bivoks (hvid), karnaubavoks, gul jernoxid E172.

Udseende og pakningsstørrelser

Pascoflair er en overtrukken, rund lysegul tablet i blisterpakninger (PVC/PVDC/aluminium)

Pakningsstørrelser: 10, 30, 60, 90 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af registreringen og fremstiller

PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH
Schiffenberger Weg 55, 35394 Giessen, Tyskland
Tlf.: +49 641 7960 0, fax: +49 641 7960 109

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Package leaflet-DK:

Product name: Pascoflair
Last update: 18.04.2016

DK: Pascoflair
NO: Pascoflair
SE: Passipas

Denne indlægsseddel blev senest ændret 18.04.2016